

# LACA ANTIMICÓTICA PARA UÑAS

VENTA LIBRE

# LAQUIIFUN<sup>®</sup>

## Amorolfina 5%

La solución tópica **más efectiva**  
para los **hongos de las uñas**



**P** LABORATORIOS  
**PANALAB**

## Amorolfina - Información

La **amorolfina** pertenece a la familia de los **antifúngicos morfólinicos**. Esta droga inhibe la síntesis del ergosterol al interferir en dos pasos de su biosíntesis: la  $\Delta 14$ -reductasa y  $\Delta 7,8$ -isomerasa. De esta forma altera la permeabilidad de la membrana plasmática de las células fúngicas, se produce la acumulación de esteroides anormales y deteriora el desarrollo de los hongos.

La laca para uñas contiene, además de la amorolfina, tres excipientes: un copolímero de ácido metacrílico, la triacelina y un solvente con etanol, butilacetato y etilacetato.

Esta droga posee un **amplio espectro antifúngico** que incluye a levaduras de los géneros **Candida** y **Cryptococcus**, dermatofitos, hongos dimorfos, hongos demateáceos (pigmentados de color pardo) y es menos activo frente a **Aspergillus**, **Fusarium** y **Mucor**. Su actividad fungicida depende de la concentración de la droga y el lapso de aplicación.

En contacto con la uña se produce un fenómeno de **sublimación de la amorolfina** que pasa **de sólido a gas** y **incrementa la eficacia** de este antifúngico. Esta laca mantiene la hidratación de la lámina ungueal mediante una semioclusión, limita de esta forma la persistencia de las esporas resistentes a los tratamientos sistémicos o tópicos.

La laca para uñas se presenta en la **concentración al 5%**. Se recomienda su aplicación **una o dos veces por semana**, debe hacer previamente un **limado** de las uñas. El envase comercial viene acompañado de instrucciones precisas para su aplicación correcta. Se recomienda para las **uñas de los pies** mantener el tratamiento durante **seis a ocho meses**; para las **uñas de las manos** se aconseja aplicarla durante **la mitad del lapso** indicado.

Se han hecho ensayo de la aplicación de esta laca con rayos láser, pero los resultados aún no están publicados.

### Indicaciones de la laca de amorolfina

**1 - Tratamiento de la onicomycosis blanca superficial.** Una vez por semana las uñas de las manos, durante 3 a 4 meses y una o dos veces por semana durante 6 a 8 semanas para las uñas de los pies.

**2 - Prevención de las recidivas.** Aplicar una vez por semana, el lapso de tratamiento no está claramente establecido.

**3 - Como coadyuvante de los antifúngicos sistémicos**, en especial terbinafina e itraconazol, mejora los resultados de estos antifúngicos sistémicos. Se indica aplicar la laca una vez por semana.

**4 - Su recomendación como monoterapia en onicomycosis de los pies, distales o laterales subungueales**, con invasión menor al 40%, no ha sido confirmada en estudios doble ciego aleatorizados.

### Los efectos secundarios

Son poco frecuentes. Si se aplica diariamente puede producir un cambio de coloración de la uña que adquiere un tono amarillo, esto desaparece cuando se suspende el tratamiento. Puede generar inflamación periungueal y dermatitis de contacto.

### Bibliografía

- Baran R, Hay R, Haneke E, Tosti A. Onychomycosis. The current approach to diagnosis and therapy. Second edition. Taylor & Francis Group. 2006.
- Foley K, Gupta AK, Versteeg S, et al. Topical and device-based treatments for fungal infections of the toenails. Cochrane Database Syst Rev 2020;1:CD012093.
- Gupta AK, Daigle D, Foley KA. Topical therapy for Toenail Onychomycosis: an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2014;15:489-502.
- Lecha M. Amorolfina and Itraconazole combination for severe Toenail Onychomycosis; results of an open randomized trial in Spain. Br J Dermatol 2001; 145 Suppl 60:21-6.
- Leung AKC, et al. Onychomycosis update review. Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery 2020, 14, 32-45.
- Negroni, R.: Tratamiento de las Onicomycosis. Revista de Patología Tropical. 2008. 37 (2): 89-110.
- Oliveira de Moraes, O et al. The use of the Er:YAG 294 nm laser associated with amorolfina in the treatment of onychomycosis.
- Watjer RM, et al. BMJ Open 2024;14:e081914. doi:10.1136/bmjopen-2023-081914

# LAQUIFUN<sup>®</sup>

## Amorolfina 5%

Laca para uñas  
Industria Argentina

Vía de administración: Tópica  
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que algunos de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

### QUÉ CONTIENE?

Fórmula: Cada 100 ml de Laca para uñas contienen:

Amorolfina (como Clorhidrato) 5,00 g; Copolímero del Ácido Metacrílico 12,50 g; Acetato de Etilo 15,00 g; Acetato de Butilo 5,00 g; Etanol Absoluto c.s.p. 100 ml.

**Acción:** Antimicótico de uso tópico y acción local.

### ¿PARA QUÉ SE USA?

Se utiliza como tratamiento complementario para lesiones producidas por hongos, que afectan las uñas de pies y manos, que presentan cambios en el color y engrosamiento de las mismas, en mayores de 18 años.

Debe consultar a su médico si empeora o si no mejora después de 1 mes de uso.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR?

No use este medicamento si UD. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula. No use en menores de 18 años. Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE UTILIZAR?

Si desarrolla sensibilidad al producto, suspenda el tratamiento y consulte a su médico. Evite el contacto con ojos y mucosas. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar con un oftalmólogo si fuese necesario.

No sobrepase la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ UTILIZANDO?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas, algunas pueden ser serias. Si esto ocurre, interrumpa el tratamiento, y consulte inmediatamente a su médico. El medicamento no debe volver a aplicarse.

Pueden producirse alteraciones de las uñas (p.ej. decoloración de la uña, roturas de las uñas y uñas quebradizas).

Las reacciones adversas que pueden ocurrir son las siguientes:

- Alteración de la uña.
- Decoloración de la uña.
- Fragilidad de las uñas.
- Uñas quebradizas.
- Sensación de quemazón en la piel.
- Reacción alérgica sistémica (una reacción alérgica seria que puede asociarse con hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, dificultad para respirar y/o erupción cutánea intensa).
- Eritema, picor, dermatitis de contacto, urticaria y ampollas.

### ¿CÓMO SE USA?

La laca para uñas debe aplicarse sobre las uñas afectadas (de las manos o los pies) una o dos veces por semana en mayores de 18 años. La duración del tratamiento dependerá de la intensidad y localización de la uña afectada, así como la velocidad del crecimiento de las uñas. Debe consultar a su médico si empeora o si no mejora o si aparecen nuevos síntomas después de 1 mes de uso.

**Forma de Administración:** Sólo para uso sobre las uñas, no debe aplicarse en la piel de alrededor de las uñas.

Este medicamento no debe ser ingerido. ES SOLAMENTE PARA USO EXTERNO.

Aplicar la laca, 1 o 2 veces por semana, sólo sobre las uñas afectadas de las manos o de los pies.

### Modo de Aplicación:

1. Preparación de la uña: Antes de la primera aplicación de la laca, es esencial limar lo más profundamente posible las partes afectadas de la uña (sobre toda la superficie).

2. Luego limpiar y desengrasar la superficie de la uña.

Repetir los pasos 1 y 2 por cada uña infectada.

Atención: Las uñas sanas no deben limarse nunca con la lima utilizada para las uñas enfermas.

3. La laca debe aplicarse sobre toda la superficie de la uña afectada.

4. Ciérrase bien el frasco inmediatamente después de aplicar la laca para evitar su evaporación.

5. Permitir que la(s) uña(s) tratada(s) se sequen durante 3-5 minutos.

Se deben aplicar medidas generales de higiene con el fin de evitar la aparición de otras infecciones o recaídas.

En caso de duda, se debe consultar con un médico o farmacéutico.

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI COLOQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital de Niños Pedro de Elizalde: Tel. (011) 4307-4788/5442.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.

### ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos: ANMAT Responde: 0800 333 1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

**Presentaciones:** Envase conteniendo 4 ml de laca, 10 espátulas de aplicación y 15 limas.

**Conservación:** Conservar a temperatura no mayor de 30°C, al abrigo de la luz.

Especialidad medicinal autorizada por el Min. de Salud. Certificado N° 47.791. Director Técnico: Germán Van Der Tuin, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 23/08/2024